

**Üretim Tarihi:**

Son Kullanma Tarihi:

Şarj Numarası :

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:  
02.05.2002- 2010/291**KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR**

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hayvan	Hayvan barmaklarında kullamlar (Boş kapalı alan)		
Boyama	Boyama yöntemi ile: AGITA™ 10WG, 80 ml tük su ile karıştırılır. 40 m <sup>2</sup> alana uygulanır.	Boyama yöntemi ile: 0,25 g a.i./m <sup>2</sup>	Boyama uygulamasında 42 gün etkilidir
Sprey	Sprey yöntemi ile: AGITA™ 10WG, 800 ml tük su ile karıştırılır. 40m <sup>2</sup> alana uygulanır.	Sprey yöntemi ile: 0,25 g a.i./m <sup>2</sup>	Sprey uygulamasında 42 gün etkilidir

**Kullanım Şekli:**

AGITA™ 10 WG, hayvan barmaklarında yapılacak olan ergin karasinek mücadelesinde sprey veya boyama şeklinde kullamlar. Uygulamanın etkinliği için, karasineklerin ürünü yiyebilecekleri yüzeylere uygulamaya yapmak gerekir. Bu nedenle boyama ya da sprey yerleri olarak, karasineklerin kondukları tük, güneşli duvarlar, pencere çevreleri seçilmelidir. Boyama Yönteminde, 100g AGITA™ 10WG, 80 ml tük su ile boyanabilir bir kıvam elde edinceye kadar karıştırılır. Bu karışım 40 m<sup>2</sup> tük bir alan için yeterlidir. Bu karışım karasineklerin kondukları tük duvarlar, pencere çevreleri, kolon ve direk gibi birkaç farklı noktaya yaklaşık 10cm x 30cm ölçülerinde uygulanır. Uygulamanın uygun olmadığı bol çatlaklı duvarlarda ise, uygulama karton veya polietilen parçalara yapılarak, bunların tavana astılması yoluyla da yapılabilir. Bu uygulama karasineklerle karşı 42 gün etkilidir.

Sprey Yöntemi: 100g AGITA™ 10WG, 800 ml tük su ile karıştırılır. Bu karışım 40 m<sup>2</sup> tük bir alan için yeterlidir. Elde edilen karışım bir sprey yardımı ile puskürtülür. Bu karışım karasineklerin kondukları tük duvarlar, pencere çevreleri, kolon ve direk yüzeylerine uygulanır. Spreylenirken, sadece hayvanların ulaşmadığı yerlere uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir. Doğrudan hayvanların üzerine, yemin ve suyun veya sağın ekipmanlarının üzerine spreyleme yapılmaz. Bu uygulama karasineklerle karşı 42 gün etkilidir.

**Uygulama Önerileri:** Uygulama için kullanılacak olan spreyi önerilen miktarda su ile doldürünüz ve 100 gr AGITA™ 10 WG yi üzerine ekleyiniz. Uygun bir süspansiyon elde etmek için iyice karıştırınız. Puskürtme işlemine 30 dakikadan fazla ara verilmiş ise, tekrar uygulamaya geçmeden önce

karşımı iyice çalkalayınız. AGITA™ 10 WG yi karışımı yaptığımız gün, mümkünse hazırladığınız hemen sonra kullanınız. Kirli ve yeni kirleşmiş yüzeylerde uygulamayınız. Ürünün etkinliğinin azalmasını ve açık alanlara yayılmasını önlemek için, su ve yağın yağmurdan korunması gereklidir. Hayvanların ulaşabileceği ve yalayabileceği yerlere uygulanmamalıdır. Sadece hayvan barmaklarında uygulanmalıdır.

Eli Lilly &amp; Company adına:

KWIZDA GmbH tarafından, Laner Strasse A-2100 Leobendorf – Avusturya adresine üretilmektedir.

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:  
LILLY İLAÇ TIC.LTD. ŞTİ.Kuşbaşı Cad. Rainbow Plaza No.4 Kat:1  
34662 Altunizade-Üsküdar / İSTANBUL  
Tel: 0216 554 00 00 Faks: 0216 554 0254

Net miktarı: 1kg - 100g

Ürün oda sıcaklığında ve kuru ortamda muhafaza edildiği takdirde raf ömrü 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünün raf ömrü 1 yıldır.

KULLANICI GRUBU  
UZMAN PERSONEL İÇİN  
KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

LILLY İLAÇ TIC.LTD. ŞTİ.

Eli Lilly &amp; Company ve çapraz çubuk Eli Lilly and Company'e, iştiaklerine veya bağlı şirketlerine ait veya onlar adına lisanslı tescilli markalardır.



AGITA™ 10 WG

Suda Eriyen Granül

Kimyasal adı	CAS Numarası	Miktarı
Thiamethoxam	153719-23-4	% 10 w/w
Cis-tricos-9-en	27519-02-4	%0,05 w/w
Yardımcı maddeler %89,95'e tamamlandı.		
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.		

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMA YINIZ.  
İNSAN VE CEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.**Boş ambalaj imha şekli:** Ürünü kullandıktan sonra usulü uygun imha ediniz. Artmış ürün ve boş kabını akarsu ve gölle atmayınız.**ÜRÜN TİPİ 18  
İNSEKTİSİT**

Zehirlenme belirtileri

Halızsızlık, yüzde yanma, batma, karıncalanma hissi, deride kızamıklık, solunum güçlüğü ve konvulziyonlar görülebilir.

Thiamethoxam'ın ratlarda akut oral LD<sub>50</sub> değeri 1563 mg/kg'dır.

İhtiyat önlemleri

Saman nezlesi, astım ya da alerjisi olanlar ürünü temas etmemelidir.

-Hastayı manız kaldığı kayıktan uzaklaştırmayı havalandırılmış bir alana veya temiz havaya çıkartın ve soğutma altında kalmasından kaçının.

-Ürün ile kirlenen elbiseyi derhal çıkartın ve ürünü vücudunuzda/deriye temas ettiği yerleri bol su ve sabun ile yıkayın.

-Gözle temas halinde gözleri birkaç dakika süre ile bol temiz su ile yıkayın ve derhal doktor yardımı alın.

-Yutulması halinde hemen tıbbi yardım alın ve bu ambalajı/etiketi doktora gösterin.

-Zehirlenme şüphesi varsa derhal doktora başvurun.

Antidotu ve gerekli bilgiler

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedaviyi doktor tarafından uygulanan ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR**

Kızgın sıcağın yüzeylere veya alevle doğru ürünü puskürtmeyiniz.

Deri, yüz ve elbise ile temasın kaçınınız. Tozlarını solumaktan kaçınınız.

Tutulmuş kaynaklardan uzak tutunuz. Yıyecek, yem ve uyarıcılardan ayrı depolayınız. Orjinal ambalajında kapalı olarak depolayınız. Doğrudan güneş ışığı almasını önleyiniz.

Anılar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ

H410-Suçul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P273-Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P391-Dokümanları toplayınız.

P501-İçeriği/kabı yerli mevzuata uygun olarak bertaraf ediniz.

Dikkat

21-06-2016

GHS09

LILLY İLAÇ

AGITA™ 10WG

Eli Lilly &amp; Company

Sağlık Bakanlığı İlişkileri Md.