

Üretim Tarihi: Son Kullanma Tarihi: Şarj numarası:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 25.07.2013 & 2013/143

KULLANILACAKI ZARARLILAR

Fareler ve Sıçanlar

KULLANIM ŞEKLİ :

- ✓ Yemden ufak bir parça yiyen fareler birkaç gün sonra ölürl.
- ✓ Yem çekgenliği yaratmadığından ön yemlemeye gerek yoktur.
- ✓ Kullanılacak yem miktarı ve yem istasyonu sayısı fare yoğunluğuna göre değişir

Yemleme noktalarını fare ve sıçanların gezindikleri güzergahlara, yuvalandıkları alanlara ve pisliklerinin görüldüğü sahalara yerleştiriniz.

Bonirat Pasta ikinci jenerasyon antikoagülan içeren, rutubete dayanıklı ve kolay uygulanabilen bir rodentisitir.

Sıçanlar için uygulama: Uygulamayı istasyonlarda yapınız. Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız. Her yemleme noktasına 30-50 g pasta koyunuz. Yoğun sıçan istilasında 5 metrede 50 g pasta, düşük sıçan popülasyonunda 10 metrede 30-50 g pasta uygulayınız.

Fareler için uygulama: Uygulamayı istasyonlarda yapınız. Yeterli miktarda yemleme noktası kullanınız. Her yemleme noktasına fare yoğunluğuna göre 2-5 metre aralıklarla 10 g pastalardan yeterli sayıda uygulayınız.

ETKİ ŞEKLİ: Bonirat Pasta; sindirim yolu ile etkilidir. Ölüm fare ve sıçanlarda birkaç gün içinde iç kanama ile gerçekleşir. Hemen ölüm görülmeyen için diğer fare ve sıçanlar da yemden alarak ölürl.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ NOKTALARA DİKKAT EDİN:

- ✓ Farelerin görüldüğü ve beslendiği tüm alanları yemleyiniz.
- ✓ Yem koyduğunuz yerleri elinize geçsen taş, tuğla, tahta ve benzeri malzeme ile farenin geçişine mani olmayacak şekilde kamufle ediniz.
- ✓ Farelerin aktivitesi sona erinceye kadar tesis ettiğiniz yem istasyonlarındaki azalan yemleri ilk miktara tamamlayınız.
- ✓ Dokunulmamış yem istasyonlarındaki yemleri yemi azalan istasyonlara koyunuz.

Üretici firmamız adı ve adresi;

Zapı S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (Pd) Italya

Ruhsat sahibi ve ithalatçı firmamız adı ve adresi;

SİS TARIM HALK SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ VE ELZ. MLK. PAZ. SAN. TİC. LTD.

ŞTİ. Atakent Mah. Ezel Sok. No:8 Ümraniye-İSTANBUL

Tel: 0 216 412 05 35 Faks: 0 216 412 05 34

Net miktarı: Genel Halk 50g, 80g, 100g, 500g, 1 Kg,

Uzman Personel 5 Kg, 10 kg, 12 kg

Ambalajı açılmış ürünü iki yıl içerisinde kullanınız.

Ürünün normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU

"GENEL HALK, UZMAN PERSONEL "

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.



BONIRAT PASTA

CAS Numarası

56073-07-5

Aktif Maddeler

% 0,005 Difenacoum (saf) a/a

Yardımcı Maddeler

% 0,001 Acı Tat Verici Madde (Bitrex) a/a 3734-33-6

Renklendirici, iştah açıcı ve Dolgu maddeleri ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEM EKİPİ İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

İçerdiği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ (14) RODENTİSİT

Anılar için zehirlidir.

Balklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR

Uyumsuzlukları da içeren Güvenli Depolama İçin Koşullar:

Orijinal ambalajında kuru ve havalandırılmış ortamda, güneş

ışınlarından uzakta ve kapalı olarak oda ısısında muhafaza ediniz.

Yiyeceklerden, yemlerden, içeceklerden ve bunların kaplarından uzak

tutunuz. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kilit

altında saklayınız. Serin, kilitli, iyi havalandırılmış yerler.

ZEHİRLENMİŞ KİŞİYİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYINIZ.

- Yutulması durumunda, hastanın bilinci açık ise kusturma yapılır.

- Protrombin ve hemogloblin seviyelerini kontrol altında tutunuz.

- Belirtilerine göre tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM) 114 NO' LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Burun kanaması, diş eti kanamaları, kanlı idrar, yaralanma olmaksızın geniş morarmalar, nefes darlığı ve akut kansızlığın diğer belirtileri

TOKSİSİTESİ: Sıçanlarda Difenacoum ağızdan akut LD50: 1,8 mg/kg

İLK YARDIM:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız ve sabun ve bol suyla yıkayınız. Devam eden tahriş halinde anti-histaminik losyona uygulayınız.

Gözle temas: Gözleri derhal açık konumda en az 15 dakika bol su ile yıkayınız ve eğer gerekiyorsa bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunumda: Hastayı açık havaya çıkartınız ve gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda : Kusturmayınız. Yağlar (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız ve midesini yıkatınız. Bir doktora ve bir zehir-kontrol merkezine başvurunuz. Yutulduğunda K1 Vitamini inhibe eder.

Antidotu: K1 Vitamini

ZARARLILIK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İBARESİ VE AÇIKLAMASI

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.



GHS08

GHS09

TEHLİKE



Handwritten signature and date