

# EK : XİL-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekticiler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri  
(başka ve damga ile ay ve yıl olarak)  
Şaşı Numarası

Sağlık Bakanlığın Ruhsat Tarihi ve Numarası:  
20.07.2011 tarih ve 2011/621 sayılı  
KULLANILACAKI ZARARLI TÜRLERİ

Zararlı Yaşam evresi	Türü Uygulama ve şekli	Uygulama alanı	Uygulama dozu
Sıçan mücadelesi	Sıçan görtülen bina içi ve mesken çevresine istasyonda	5-10 metre de bir kurulacak istasyonda	100-400 gr
Fare mücadelesi	Fare görtülen bina içi ve mesken çevresine istasyonda	3-5 metrede bir kurulacak istasyonda	10-30 gr

1 pastanın ağırlığı 10 gr'dır.

**Kullanım şekli:** Bu yağlı yem fare ve sıçanlar için son derece cazip olan küçük kullanıma hazır zarflar içinde sunulan bir yemdir. Kemirgenler yedikten sonra yedi ila dokuz gün içinde ölürler. İçinde insanlar ve evcil hayvanlar için itici bir madde bulunur. Rodentisit yemler ev ve iş yerlerinde, endüstriyel yapılarda, gıda sanayi işletmelerinde ve mesken çevrelerinde, fare ve sıçan görtülen kapalı alan ve mesken çevresinde kullanılır. Yemler oyuklara, duvar diplerindeki kemirgen yollarına, sığınıklar arasında istasyonlar yerleştirilmelidir.

Fare izlerinin gördüğü yerlere 3-5 metrede bir kurulacak istasyona 10-30 gr yem koyunuz.

Sıçan izlerinin gördüğü yerlere 5-10 metre de bir kurulacak istasyona 100-400gr yem koyunuz. Yemleri tamamen yemmeden önce yenileyin. Yeni gelenleri kontrol etmek ve engellemek için bir doz yem bırakın. Bozulmaya başladığında hemen yemi değiştirin.

Üretici firmanın adı ve adresi;  
35010 Borgorico (PD) ITALY

Ruhsat sahibinin adı ve adresi  
VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.  
ŞİŞANE OKÇUMUSA CAD. DEMET APT. NO: 15/13  
BEYOĞLU / İSTANBUL - TÜRKİYE Posta Kodu: 34420  
Tel:02126596169 Faks:0212 252 13 11

Net miktarı:

Genel Halk:80gr(10gr\*8adet) 120gr(10gr\*12adet)  
100gr(10gr\*10adet)200gr(10gr\*20adet)250gr(10gr\*25adet), 500gr (10gr\*50adet)

Uzman Personel: 2kg(10gr\*200adet) 5kg(10\*500adet)  
Ambalajın açılması ürünü 1 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarında (25C ± 2) raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU  
( GENEL HALK-UZMAN PERSONEL )

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ

VEBİ BİOKİMYA SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.



## MURIN PASTA

Fare ve Sıçan Öldürücü  
Formülasyon şekli: Kırmızı Yağlı Pasta

**Aktif maddenin adı ve miktarı (%)**

**Bromadiolone**

Miktarı: 0.005% Cas no: 28772-56-7

**Yardımcı Maddeler ve miktarları:**

Denatonium benzoate (Cas no: 3734-33-6) 0.001%  
Emülgatör %0,30, Lezzetli çözücü %2,0, Koruyucu  
%0,15, Yem %97,474, Koruyucu, Renklendirici pigment  
%0,01, Antioksidan %0,06 ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRERLERİNİ SOLUMAYINIZ.  
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK  
KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA  
HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARAYA  
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ  
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA  
UYUNUZ.

Boş Ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

**ÜRÜN TİPİ 14  
RODENTİSİT**

**Zehirlenme belirtileri:** Kusma bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı.

**LD 50 değerleri:**

Bromadiolone Akut Oral LD 50: (sıçan): 0.56-1.31 mg/kg

**İlk yardım önlemleri:**

Solumun: Ürün aerosol değildi. Ancak ürünün buharını uzun süre solumuş kişiyi temiz havaya çıkartın ve dinlenmesini sağlayın.

Deri : Çiidi hemen bol sabunlu suyla yıkayın.

**Göz:** Göz kapaklarınıza kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarksa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun.

**Yutma:** Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulmuşsa derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir.

**Antidotu ve gerekli bilgiler:** K1 Vitamini'dir. Yetişkinlerde toplam 40 mg/gün bölünmüş dozlarda çocuklarda 20 mg/gün bölünmüş dozlarda oral ya da enjeksiyonla, damardan veya adaleden verilmelidir. Hasta normale dönene kadar doktor kontrolünde tutulmalıdır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA ULUSAL ZEHİR  
MERKEZİ'ni(UZEM) 114 NO'lu TELEFONUNU ARAYINIZ

ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR

Maddeyi orijinal ambalajında 25C ± 2'de depolayınız. Ortamda sigara içmek, herhangi bir şey yemek içmek yasaktır. Depo kuru, serin olmalı ve iyi havalandırılmalıdır. Yiyecek, içecek hayvan besleme alanlarından uzak tutunuz. Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak tutun. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Uyumuz maddeler ile birlikte ( kuvvetli oksitleyiciler, kuvvetli indirgeyiciler ) depolanmayın. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır. Arılar için zehirlidir.

Baklılara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**Zararlılık ifadeleri:**

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınuz

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

**Önlem ifadeleri:**

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solmayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınuz

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.



BAKANLIK ONAYI

2.1-12-2016

VEBİ BİOKİMYA  
SANAYİ VE DİŞ TİCARET  
LİMİTED ŞİRKETİ

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekticiler)