

## EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığının Ruhsat Tarihi ve Numarası  
KULLANILACAGI ZARARLI ORGANİZMALAR  
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hamamböceği	Kapalı alan Şırınga ve/veya özel tabanca	0.03 gr jel (1 damla) /1m <sup>2</sup>	122 gün

1 damla ağırlığı: 0.03 gr ağırlığındadır.

**KULLANIM ŞEKLİ:** Şırınga veya özel tabanca ile 0.03 gr jeli besledikleri yerler ile yuvalandıkları yer güzergâhları (sığınak, koridor, duvar boşluklarına, zemin kenarları ya da köşelerine, mutfak tezgahlarına, kabinlere, etajlere, asma tavanlara) gibi hamamböceklerinin bulunabileceği yerlere uygulayın. Ultra MaxSyringe Hamamböceklerinin gizlendikleri, yiyecek aradıkları ve besledikleri yerlere ve yakınlarına uygulandığında etkisi en yüksek düzeye çıkar. Bu yerler genellikle karanlık, sıcak, nemli ayrıca buzdolaplarının arkası ve elektrik tesisatları gibi rahatsız edilmedikleri yerlerdir. Bu tür yerler, öncelikle tespit edilmeli, en iyi sonuç alabilmek için önceden temizlenmeli, diğer yiyecek kaynakları uzaklaştırılmalı ve uygulama yapılmalıdır. Jel damlaları karanlık köşelere, duvar çatlaklarına, dolap ve raf arkalarına, mutfak tezgâhlarının altına, elektrik kontrol kutularına, banyo teçhizatlarının alt taraflarına, su ve tahliye borularına uygulanır. Bulaşık alanlarda ölü hamamböcekleri uygulamadan 24 saat sonra görülmeye başlanır. Uygulanan alanlar 1-2 hafta sonra kontrol edilmelidir. Uygulanan yerlerde hala yem yenildiği halde canlı hamamböcekleri görülüyorsa ikinci bir uygulama gerekebilir.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Kukbo Science Co.,Ltd.

49, Sandan-ro, Heungdeok-ku, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Ruhsat sahibinin adı ve adresi;

Entokim Çevre Sağlığı Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti

İstoç 44. Ada No: 13 İkitelli Bağcılar / İstanbul

TEL: (212)659 61 71 FAX: (212)659 61 68

NET MİKTARI:

5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g

BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/HAŞERE KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Açılmış ürünü 1 (bir) ay içerisinde tüketiniz.  
Ürünün normal depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU  
(GENEL HALK)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ  
MUTLAKA OKUYUNUZ.

ENTOKİM ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ  
SAN.TİC.LTD.ŞTİ



Ultra Max Syringe  
(Hamamböceği Jeli)

Formülasyon şekli: Jel

Aktif madde adı ve Miktarı:(w/w)

Fipronil

Miktarı: % 0,05 CAS No:120068-37-3

Yardımcı Malzeme adı ve Miktarı:

Eksipiyen: % 33,3, Tatlandırıcı Madde: % 9,1, Çekici % 40  
Donma önleyici: % 10,2, Koruyucu: % 0,5 ve Çözücü % 6,85  
ile % 100 'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN  
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMELER İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe  
uygun olarak bertaraf ediniz.

ÜRÜN TİPİ: 18

İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri : Mide bulantısı

LD50 değerleri

FipronilAkut Oral (Sıçan ): 92 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Genel Belirtiler: Herhangi bir durumda doktora başvurulması  
daha iyi olur. Bilinci yerinde olmayan kişiye ağızdan herhangi bir  
madde vermeyiniz.

Solunması halinde: Ürün aerosol değildir. Ancak ürünün buharını uzun süre solumuş kişiyi temiz havaya çıkartın ve dinlenmesini sağlayın. Önlem olarak tıbbi yardıma başvurunuz.

Deri ile temas halinde: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Gözle temas halinde: Özel önlemler (etikete bakın). Göz kapaklarınızı kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarıksa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun.

Yutulması halinde: Ağızınızı çalkalayın. ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir.

Antidotu: Belirli bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İyi havalandırılmış bir alanda 25C ± 2'de depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta saklayınız. Isı kaynaklarından ve okside edici etmenlerden uzak tutunuz. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.

Ardılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık İfadeleri:

Bulunmamaktadır.

Önlem İfadeleri:

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P501: İçeriği/kabı yönetmeliğe göre bertaraf edin.

Uyarı İşareti: Bulunmamaktadır.

Uyarı İfadesi: Bulunmamaktadır.

BAKANLIK ONAYI

ENTOKİM  
ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ  
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
İSTOÇ 44. Ada No: 13 Bağcılar - İSTANBUL  
Tel:(0212)659 61 71 Fax:(0212)659 61 68  
GÖNEŞLİ V.D.388 013 2465

01 Haziran 2017

